

कक्षा-बारकी

विषय - रसायन विज्ञान
आदर्श उत्तर

1. (i) (a) 55.6
(ii) (a) cm^{-1}
(iii) (a) शून्य
(iv) (a) सुको तल
(v) (c) अमोनियाय सिल्वर नाइट्रेट
(vi) (c) हीमोग्लोबिन

2. (i) समपरासरी
(ii) 96500
(iii) Zn (जिंक)
(iv) CHCl_3
(v) नाइट्रोबेन्जीन
(vi) विटामिन K

3. (i) सत्य
(ii) असत्य
(iii) सत्य
(iv) असत्य
(v) असत्य
(vi) सत्य

4. (a) (b)
(i) फेराइट — (c) $\text{W} \times \text{Q}$
(ii) देहली कर्ग — (d) लुक्किय कण्ट
(iii) लिगेण्ड — (e) डीलेट
(iv) कैल्शियम एसीटेट — (f) एसीटोन
(v) ब्लोरोफार्म — (g) निश्चेतक

$$5. (i) M = \frac{W_B}{M_B} \times \frac{1000}{V(ml)} = \frac{n_B}{V(lit)}$$

$$(ii) Cr = 1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^1, 3d^5$$

(iii) ethanoic acid (इथेनोइक एसिड)

(iv) एनीलीन

(v) सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता।

प्रश्न-6 - किसी पदार्थ का विद्युत-रासायनिक तुल्यतांक,
किसी पदार्थ का वह इत्यमान है जो चरमपिथर
की विद्युत धारा को एक सेकण्ड तक प्रवाहित
करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त या जमा हो जाता है।

श्रद्धावा

ओम का नियम - किसी धातु-चालक श्रद्धावा क्लियन
में बहने वाली विद्युत धारा की प्रवृत्ता-चालक के
सिरो पर लगने वाले विभवान्तर के समानुपाती होती है।


$$V \propto R$$

$$V = RI$$

R = प्रतिरोध, V = विभवान्तर, I = धारा

प्रश्न-7 सक्रियण ऊर्जा + शौरतगतिक ऊर्जा = देहली ऊर्जा
श्रद्धावा

प्रथम कोटि की अभिक्रिया - वह अभिक्रिया जिसमें
अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की शुरुआत सान्द्रता के
प्रथम घात के समानुपाती होता है।



अभिक्रिया की दर $\propto [NH_4NO_2]$



प्रश्न-8 मिश्रधातु- दो या दो से अधिक धातुओं और-
अधातुओं के समोष्मी मिश्रण को मिश्रधातु कहते हैं।

उदा- पीतल, कांसा, स्टील

अथवा


संक्रमण धातुओं में (n-1) d कक्ष के इलेक्ट्रान भी-
बंध बनाने में भाग लेते हैं अर्थात् (n-1) d कक्ष
अपूर्ण होने के कारण संक्रमण धातुएँ प्रबल
संयोजकता प्रदर्शित करती हैं।

प्रश्न-9. एल्किल हैलाइड तथा सोडियम एल्काक्साइड
के बीच क्रिया से ईथर बनता है इसे विलियमसन
संश्लेषण कहते हैं।




अथवा

एथेनाल के अम्लीय निर्जलीकरण से एसीन बनता है।



इथेन

प्रश्न-10. असममित ईथर- ऐसे ईथर जिनमें ऑक्सीजन
परमाणु के दोनों ओर दो अलग-अलग एल्किल
समूह जुड़े हों उन्हें असममित ईथर कहते हैं।



मिथाइल एथेन

अथवा

100% एथेनाल को चरित्रपूर्ण एल्कोहल कहते हैं।
इसे परिशोधित स्पिरिट में बेजीन मिलाकर पमाजी
आसवन द्वारा प्राप्त करते हैं।

प्रश्न-11.

(1) विटामिन A (रेटीनाल) रतोंधी-

(2) विटामिन B-1 (थायमीन) बेरी-बेरी

अथवा

DNA

RNA

(1) इसकी द्विहेलिकस संरचना होती है।

(2) इसमें डी आक्सीराइबोज शर्करा होती है।

(3) सामान्यतः केन्द्रक में पाया जाता है।

(1) यह एकलहेलिकस होते हैं।

(2) इसमें राइबोज शर्करा होती है।

(3) सामान्यतः सारायोल्लाज्म में पाया जाता है।


प्रश्न-12. एन्जाइम - ये डब्ल्यू डब्ल्यू भार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं जो जीवित कोशिका में पाए जाते हैं एवं जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अतः इन्हें जीव-उत्प्रेरक कहते हैं।

उदा. : माग्नेज, जाइमेज

अथवा

शर्करा दक्षिण घुबण घूर्णक (D) होती है जो डब्ल्यू डब्ल्यू एन्जाइम की उपस्थिति में गल अवस्थिति लेकर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में

हूट जाता है जो मिश्रण का कुल द्रव्यमान (L) हो जाता है। यतः इस मिश्रण को इन्वर्सिड शर्करी कहते हैं।



प्रश्न-13. राउल्ट के नियमानुसार - "स्थिर ताप पर जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्पदाव (P_A) विलायक के मोल-प्रभाज के समानुपाती होता है।

$$P_A \propto X_A$$

$$P_A = P_A^0 X_A$$

$$P_A = P_A^0 (1 - X_B)$$

$$P_A = P_A^0 - P_A^0 X_B$$

$$P_A^0 X_B = P_A^0 - P_A$$

$$X_B = \frac{P_A^0 - P_A}{P_A^0}$$

अतः वाष्पदाव में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल-प्रभाज के समानुपाती होता है।

अथवा

जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन में विलयन की मोललता (m) के समानुपाती होता है।

$$\Delta T_b \propto m$$

$$\Delta T_b = K_b \cdot m$$

$$m = \frac{W_B}{M_B} \times \frac{1000}{W_A}$$

$$\Delta T_b = \frac{K_b W_B}{M_B} \times \frac{1000}{W_A}$$

$$M_B = \frac{K_b \times W_B \times 1000}{\Delta T_b \times W_A}$$

M_B ~~का~~ = विलेय का आणविक द्रव्यमान

प्रश्न 14 ~~का~~ इसा-अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक -

(i) अभिकारकों की सान्द्रता

(ii) ताप

(iii) द्रव

(iv) उत्प्रेरक

(v) अभिकारक की प्रकृति

अथवा

प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{a}{a-x}$$

अर्धआयुष्काल पर

$$t = t_{1/2}$$

$$(a-x) = a/2$$

$$k = \frac{2.303}{t_{1/2}} \log \frac{a}{a/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{2.303}{K} \log 2 \quad (\log 2 = 0.3010)$$

$$t_{1/2} = \frac{2.303}{K} \times 0.3010$$

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{K}$$

उपरोक्त समीकरण दर्शाता है कि प्रथम कोटि के लिए अर्धआयु का मान अभिकारक के प्रारंभिक सान्द्रता पर निर्भर नहीं करता है।

प्रश्न-15: आवर्त सारणी में के तत्व जिनमें परमाण्वीय अवस्था में ० कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं ये वर्ग 3 से 12 तक के तत्व होते हैं।
इन्हें 4 श्रेणी में रखा गया है-

- (1) प्रथम संक्रमण श्रेणी (3d श्रेणी) Sc से Zn तक
 - (ii) द्वितीय संक्रमण श्रेणी (4d श्रेणी) Y से Cd तक
 - (iii) तृतीय संक्रमण श्रेणी (5d श्रेणी) La से Hg तक
 - (iv) चतुर्थ संक्रमण श्रेणी (6d श्रेणी) Ac से Cn तक
- अध्यास


लैन्थेनाइड संकुचन - लैन्थेनाइड्स में परमाणु कक्षाएं बढ़ने के साथ-साथ उनके परमाणु आकार एवं आयनिक त्रिज्या में कमी होती जाती है इसे लैन्थेनाइड संकुचन कहते हैं।

कारण → लैन्थेनाइड में जाने वाले काला 14वां इलेक्ट्रॉन (n-1) f कक्षक में प्रवेश करता है जिसका परिरक्षण गुण कम होता है जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है।


प्रश्न-16 उत्तर (i) प्राथमिक एमीन - इसमें नाइट्रोजन से एक एम्बिल समूह जुड़ा होता है।



(ii) द्वितीयक एमीन $\Rightarrow$ इसमें नाइट्रोजन से दो एम्बिल समूह जुड़े रहते हैं।





(iii) तृतीयक एमीन - इसमें नाइट्रोजन से तीन एम्बिल समूह जुड़े रहते हैं।



नमूना

एनीलीन तथा हाइड्रोक्लोडिल विलयन में 50°C ताप पर सोडियम नाइट्राट मिलाने पर बेन्जीन डाई-एजोनियम क्लोराइड बनता है।






प्रश्न-17. संज्ञाकरण - वायु तथा नमी के कारण धातु की

क्षपटी सतह बनकर होना संज्ञाकरण कहलाता है।

अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करती है इसे संज्ञाकरण सेल कहते हैं। इसमें शुद्ध लोहा एनोड तथा अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है।

एनोड पर - $[\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2e^-] \times 2$









जंग

शब्दार्थ

डैनीयल सेल - यह एक विद्युत रासायनिक सेल है। इसमें Zn की छड़ ZnSO_4 के विलयन में एवं Cu की छड़ CuSO_4 के विलयन में डूबी रहती है। दोनों इलेक्ट्रोडों को धातु के तार से गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। दोनों अर्धसेलों को लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है।




प्रश्न 18

- (i) टेट्रा एमीन क्रोमियम (II) सल्फेट
- (ii) हेक्सा पोटेरियम हेक्सा सायनाइडो फेरेट (III)
- (iii) डाई एमीन डाई क्लोरोडो नायट्रन (II)
- (iv) टेट्रा एमीन निकेल (II) क्लोराइड

कीलेट- जब कोई बहुदन्तुर लिगेण्ड धातु से गुंठार-चक्रीय संरचना बना लेता है तो इसे कीलेट कहते हैं।

उदा →





निम्नलिखित डार्बिन्ग्स ग्लाइसिमीन

महत्व - (i) अन्तर संक्रमण तत्वों के प्रथमकरण में

(ii) कठोर जल के प्रथमकरण में

प्रश्न-19 कार्बिल एमीन - एलिफैटिक या ऐरोमैटिक प्राथमिक एमीन को CHCl_3 एवं एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गन्धि युक्त फेनिल आइसोसायनाइड बनता है।




अभिवार

हैलोएन्थेन की तुलना में हैलोएरीन कम प्रियाशील होते हैं इसके दो कारण हैं-


- (1) संकलन - हैलोएन्थेन में sp^3 संकलन होता है जिसकी 5 प्रकृति कम होती है एवं बंध-बल बढ़ाई जाधि- होती है जिससे यह बंध आसानी से टूट जाता है जबकि हैलोएरीन में sp^2 संकलन होता है जिससे यह दुदता से जुड़ा रहता है।



- (2) अनुनाद - हैलोएरीन में अनुनाद के कारण $C-X$ बंध में द्विबंध की प्रकृति आ जाती है अतः ये कम प्रियाशील होते हैं।




प्रश्न-20 - कॅनीजरो अभिक्रिया $\Rightarrow$ α -हैड्रोजन बिहीन एल्डिहाइड को क्षार के साथ गर्म करने पर एक प्रभु α -एल्कोहल में अपचयन और दूसरे प्रभु का कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकरण हो जाता है।



एल्डोल संघनन

२- हाइड्रोजन युक्त दो एल्डिहाइड के अणु H-की
उपस्थिति में संयोग करके एल्डोल बनाते हैं।



अंशक

